



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

AMINAX MAR es una formulación energizante con acción bioestimulante y nutricional para los cultivos. Aporta los beneficios del Ácido L-glutámico, péptidos de bajo peso molecular derivados de pescado, que contribuye una fuente importante de aminoácidos. También aporta nutrientes claves como calcio y zinc que masifican la cabellera radicular de los cultivos; así como favorecen la turgencia y desarrollo de los frutos.

BENEFICIOS

AMINAX MAR cuando es aplicado a la zona radicular mediante el fertirriego estimula la emisión y desarrollo de nuevas raíces. Cuando es aplicado al área foliar favorece el brotamiento, floración, engorde y color de los frutos en diversos cultivos. **AMINAX MAR** constituye una gran fuente de energía, que le permite superar el estrés abiótico, debido a que las plantas disponen de los aminoácidos libres para mejorar su resistencia y adaptación a todo tipo de estrés ambiental, incrementando el potencial del cultivo en producción y calidad.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada cuando la aspersión haya secado sobre las hojas o después de una (1) hora de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

- Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de mezclar **AMINAX MAR** con otros productos que se aplicaran en el mismo tanque de mezcla.
- No se recomienda aplicar en conjunto con otros productos de marcada reacción ácida o alcalina.

FITOTOXICIDAD

AMINAX MAR no es fitotóxico en los cultivos recomendados ni las dosis recomendadas. Las aplicaciones en condiciones desfavorables para el cultivo deben evitarse (horarios de altas temperaturas, precipitaciones, problemas de salinidad y asfixia radicular en el suelo, etc.).

RESPONSABILIDAD CIVIL: COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta etiqueta.

Aminoácidos - Energizante y Enraizante

BIOESTIMULANTE AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

Composición (p/v)

Aminoácidos libres totales 100 g/L
Péptidos de pescado 80 g/L
Ácido L- glutámico 100 g/L
Calcio (CaO) 50 g/L
Zinc (Zn) 10 g/L
Auxiliares de formulación c.s.p 1L

Formulado y Distribuido por:
Comercial Andina Industrial S.A.C.
Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II.
Lima 18 - Perú. Telf.: (01) 255-2830
e-mail: atencionalcliente@grupoandina.com.pe

CONTENIDO NETO: 1 LITRO

Lote N°:
F. de Form:
F. de Venc:

“AGITAR ANTES DE USAR”

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS		MOMENTO DE APLICACIÓN
	L/Ha Vía foliar	L/Ha Vía riego	
Vid	2	5-10	Realizar un mínimo de 2 a 3 aplicaciones distribuidas entre las fases de prefloración, desarrollo de bayas y el inicio de tinta. Se puede alternar con enraizadores hormonales que promueven las raíces laterales, usando el hormonal al inicio y alternando con el AMINAX MAR para complementar el crecimiento de las raíces y fortalecer el fruto durante su desarrollo para lograr mayor vida anque poscosecha.
Arándano	2	5-10	Realizar un mínimo de 2 a 3 aplicaciones distribuidas en diversos estados fenológicos y con énfasis de la aplicación al inicio de floración y durante el desarrollo del fruto. Se puede alternar con enraizadores hormonales que promueven las raíces laterales, usando el hormonal al inicio y alternando con el AMINAX MAR para complementar el crecimiento de las raíces y fortalecer el fruto durante su desarrollo.
Palto, mango olivo	2	5	Se recomienda un mínimo de 2 a 3 aplicaciones: 1. Al inicio de la floración como inductor radicular 2. Durante la etapa de cuajado y desarrollo del fruto.
Cítricos: Mandarina, naranja, limón tahiti, limón sutil, toronja.	2	5-10	Realizar un mínimo de 2 a 3 aplicaciones distribuidas entre las fases de floración y desarrollo del fruto y que coincidan con los flash radicular de los cultivos.
Espárrago	2	5	Realizar un mínimo de 2 aplicaciones distribuidas entre las fases de desarrollo del primer brote y el inicio del segundo brote en el cultivo.
Pitahaya, granado	2	5	Realizar un mínimo de 2 aplicaciones distribuidas entre las fases de crecimiento vegetativo y reproductivo del cultivo.
Arroz, papa, maíz, páprika, ajo, pimiento, tomate, cebolla	1 - 2	5	Realizar un mínimo de 2 aplicaciones distribuidas entre las fases de crecimiento vegetativo y reproductivo del cultivo.