

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

BRIXHOR es un bioestimulante precursor de etileno que gracias a sus activos tiene un gran efecto sobre el transporte y la acumulación de reservas en los frutos para favorecer la toma de coloración, llenado, incremento de grados Brix y la homogenización de las características deseables del fruto a cosechar.

PRECAUCIONES

- Consérvese en lugar fresco y en su envase original.
- No lo transporte y almacene con alimentos y animales.
- Usar la mezcla inmediatamente después de preparada.
- No es tóxico a los humanos y animales.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta etiqueta.

BRIXHOR

(Brix y color)

BIOESTIMULANTE

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

Composición (P/V)

Precusores de etileno (L-Metionina)	20%
Potasio (K ₂ O)	15%
Molibdeno (Mo)	2%
Boro (B)	2%



Formulado y Distribuido por:

Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II.
Lima 18 - Perú. Telf.: (01) 255-2830
e-mail: atencionalcliente@grupoandina.com.pe

CONTENIDO NETO: 1 LITRO

Lote N°:
F. de Form:
F. de Venc:

RECOMENDACIONES DE USO

Para la dilución del BRIXHOR en el tanque de aplicación, debe regularse el pH del agua a valores ácidos entre 5-6, para lograr esto se recomienda el uso de un regulador de pH.

CULTIVO	DOSIS		RECOMENDACIONES
	ml/200L	L/ha	
Arándano	500	2	Realizar dos aplicaciones: Al inicio del envero y repetir la aplicación cuando se tenga el 50% de la toma del color en la maduración.
Durazno		2 - 3	
Granado			
Mango			
Manzano			
Vid			
Cítricos: Mandarina, naranja.			

MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

1ra Aplicación: Inicio del envero.

2da aplicación: con el 50% de la toma de color en la maduración.

COMPATIBILIDAD

BRIXHOR compatible con la mayoría de plaguicidas agrícolas. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.