27.50 centímetros

2.10 centímetros

14.00 centímetros

0.20 cm

0.20 cm

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**
**"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- La aplicación de CapsiAlil® debe ser efectuada por operarios agrícolas debidamente protegidos con los elementos de seguridad correspondientes al manejo de extractos vegetales de uso agrícola (overol, guantes, gorra, botas de caucho, caretas, gafas).
- No ingerir.
- No se exponga al contacto, ni respire la niebla o vapores provenientes de la aspersión.
- Este producto puede ser irritante, por lo tanto, evite el contacto con la piel, ojos y mucosas.
- No comer ni beber ni fumar durante las operaciones de mezclas y aplicación.
- CapsiAlil® no debe ser transportado ni almacenado junto con alimentos, bebidas, medicamentos ni plaguicidas químico.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado en un lugar fresco y airado, protegido de la incidencia directa de los rayos del solar y las altas temperaturas.
- No utilizar ningún envase que haya contenido extractos vegetales de uso agrícola para almacenar alimentos o agua potable.
- Despuesde usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**PRIMEROS AUXILIOS**

En caso de intoxicación llamar al médico o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.

- En caso de ingestión: no provocar el vómito y consultar al médico.
- En caso de contacto con la piel: podría ser irritante, lavar con abundante agua y jabón, en caso de que la irritación persista consultar al médico
- En caso de contacto con los ojos: lavar con abundante agua por 10 minutos, si la irritación persistiera consultar al médico.
- En caso de inhalación; retirar al afectado de la zona tratada a un lugar ventilado.

Nota al medico
Teléfonos de emergencia: INFOSALUD: 0800-10-828, CISPROQUIM: 080-050-847
Antídoto: Tratamiento sintomático.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devueva al envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Ningún envase que haya contenido el plaguicida debe reusarse.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

ECONOMÍA SEGURIDAD AMBIENTE
TRIPLE LAVADO

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin. Peligroso para los peces.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales doméstico, fauna y flora. No permitir animales en el área tratada.

# CapsiAlil®

**(Extracto vegetal)**

**REPELENTE BIOLÓGICO DE INSECTOS Y PÁJAROS DE USO AGRÍCOLA**

## CONCENTRADO SOLUBLE - SL

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Extracto de Ajo ..... 542,0 g/L
Extracto de Aji ..... 434,0 g/L
Aditivos .....c.s.p. 1Litro

**Reg. PBUA N° 152-SENASA**

Titular del registro:
FSR Consultores E.I.R.L.
Av. Las Camelias No. 877, Of 302, San Isidro, Lima.
Teléfono: 5005349

**Formulado por:**

ecoflora Agro
ECOFLORA AGRO S.A.S
Indiana Center
Alto de las Palmas vía
Medellín-Rionegro
Oficina 281.
Telf: (57-4) 4481186
www.ecofloragro.com

**Importado y distribuido por:**

Comercial Andina Industrial S.A.C.
Av. Alfredo Benavides No.1579.7mo piso.
Of .702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú.
Teléfono:(01) 255-2830
atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Lote Nº :
F. Form.:
F. Venc.:

CONTENIDO NETO:
1 Litro

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

CapsiAlil® tiene un efecto repelente e irritante sobre adultos y estados inmaduros de thrips, ácaros y coleópteros. Debe aplicarse garantizando una buena cobertura en toda la superficie foliar (haz y envés). Por tratarse de un producto biodegradable y de baja persistencia, debe ser aplicado de forma preventiva por lo menos una vez a la semana de forma irregular y continua. Es muy efectivo en el marco de programas de Manejo Integrado de Cultivos (MIC) pues potencializa la captura mediante aspiradoras y trampas y hace más vulnerable al insecto con el uso selectivo y racional de productos de contacto, tanto de origen biológico como de síntesis química, tras un preciso monitoreo.

Sistemas de preparación y aplicación

CapsiAlil®, es un concentrado soluble que se diluye en el agua; para preparar la mezcla, agitar fuertemente el envase antes de abrirlo. Medir la cantidad recomendada y diluirla con suficiente cantidad de agua para luego llevar el volumen o concentración deseada. La mezcla debe usarse inmediatamente después de ser preparada la solución.

Las aplicaciones se deben realizar por las primeras horas de la mañana o por la tarde cuando la temperatura sea baja

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

Cuadro de usos

| Cultivo | Plagas | | Dosis (mL/200 L) | PC | LMR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre científico | | | |
| Espárrago | Mosquilla del brote | Prodiplosis longifila | 100 a 200 | N.A. | N.A. |
| Vid | Mielero Chisco o Soña | Coereba flaveola Mimus longicaudatus | 60 a 80 | N.A. | N.A. |
| | Chanchito blanco | Planococcus citri | 400 | N.A. | N.A. |
| Banano | Thrips de la mancha roja | Chaetanaphothrips spp. | 400 | N.A. | N.A. |
| Cebolla | Thrips | Thrips tabaci | 300 a 400 | N.A. | N.A. |

PC: Periodo de carencia LMR: Límite máximo de residuo NA.: No aplica

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda realizar 2 aplicaciones en forma consecutivas para tener un buen efecto de control, el intervalo de aplicación es de 7 a 10 días dependiendo de las evaluaciones de campo.

**PERIODO DE REINGRESO**

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Puede ser utilizado en un programa de Manejo Integrado de Plagas (MIP) y de Manejo Integrado de Cultivos (MIC), puede ser mezclado con insecticidas; para comprobar la compatibilidad, mezclar en un recipiente cantidades proporcionales de CapsiAlil® y el otro plaguicida o sustancia afin; agitar la mezcla y dejar reposar durante quince (15) minutos. La formación de un precipitado que no se dispersa indica la incompatibilidad de los productos.

**FITOTOXICIDAD**

CapsiAlil® no presenta fitotoxicidad utilizado a la dosis recomendada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"

Versión 01

**PRECAUCIÓN**

0.50 cm

0.50 cm

Nº DOCUMENTO: _____ CÓDIGO: _____ VERSIÓN: 01 VIGENCIA: 02 / 12 / 2018

DENOMINACIÓN: ETIQ. ADH. CAPSIALIL X 1L
PROVEEDOR:
MATERIAL: COUCHE AUTOADHESIVO PLANO
Nº DE COLORES: 5 COLORES (SELECCION + 1 ESPECIAL)
Nº DE PANTONES:
- CYAN
- MAGENTA
- AMARILLO
- NEGRO
- VERDE PANT. 347 C.
- BARNIZ UV

USO:

APROBADO POR:

SELLO

OBSERVACIONES:
CAMBIOS REALIZADOS
1.- Nueva Etiqueta.