

14.5 cm x 29.2 cm

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO”**
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos y si el contacto fuese por la piel lávese con abundante agua limpia y jabón.

Nota al médico: Tratamiento sintomático si aparece diarrea. No se recomienda el lavado gástrico a menos que se haya ingerido grandes cantidades.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C.: 01- 255-2830

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inútilcelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

Citogib®

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Giberelinas 21.04 g/L
Citoquininas 20.61 g/L
Aditivos c.p.s. 1L

Reg. PBUA N° 110-SENASA

Titular de Registro, Formulator y Distribuidor:



Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 255-2830 / atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Contenido Neto: 1L

N° de Lote:
F. de Form:
F. de Venc:
® Marca registrada

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Citogib® es un Regulador de Crecimiento de plantas a base de Citoquininas y Giberelinas, las cuales tienen por efecto el desarrollo uniforme de los frutos. Además permite la elongación y división celular obteniéndose así tallos bien conformados.

Modo de empleo: Se elabora la mezcla disolviendo la cantidad recomendada del producto en un recipiente con agua. Luego, se transfiere la solución al cilindro o mochila de aplicación, según corresponda, y se añade agua hasta alcanzar el volumen necesario. Es importante agitar bien la mezcla antes de proceder con la aplicación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Momento de aplicación (antes de cosecha)	Dosis en 200 L agua	P.C. (días)	LMR (ppm)
Alcachofa	20 - 25 días	125 ml	N.A.	N.A.
Ajo	30 días	150 ml	N.A.	N.A.
Arándano	30 días	80 - 100 ml	N.A.	N.A.
Arroz	45 días	30 ml	N.A.	N.A.
Cebolla Amarilla	25 - 30 días	125 ml	N.A.	N.A.
Cebolla Roja	20 - 25 días	125 ml	N.A.	N.A.
Haba	25 días	125 ml	N.A.	N.A.
Melón	15 - 20 días	125 ml	N.A.	N.A.
Papa	20 - 25 días	125 ml	N.A.	N.A.
Paprika	20 - 25 días	125 ml	N.A.	N.A.
Sandía	20 - 25 días	200 ml	N.A.	N.A.
Zapallo	20 - 25 días	125 ml	N.A.	N.A.
Palto	25 - 30 días	80 - 100 ml	N.A.	N.A.

LMR: Límite Máximo de Residuos PC: Periodo de carencia N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda el uso del producto 15 a 45 días antes de la cosecha. Realizar de 1 a 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Citogib® es compatible con la mayoría de plaguicidas agrícolas, excepto con los agentes oxidantes fuertes. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

Citogib® no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



1.3 cm

Banda verde Pantone 347 C

Fondo Citogib
Pantone 1795C

Logo caisac
Pantone 711 C

Logo caisac
Pantone 2945 C