

14.5 cm x 29.2 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106 / COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C.: 01- 255-2830

Nota al médico:

Tratamiento sintomático.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



CONCENTRADO SOLUBLE - SL

Composición

Citoquininas12 g/L

Aditivosc.s.p 1L

Registro: PBUA N° 359 - SENASA

Titular del Registro, formulado y distribuido por:



Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 255-2830- atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Contenido Neto: 1L

Lote N°:
F. de Form:
F. de Venc:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CYTHOR es un regulador del crecimiento que tiene como base el extracto de algas marinas (*Ascophyllum nodosum*) con una alta concentración de citoquininas que presenta alta actividad de división celular en los cultivos promoviendo la floración, potenciando el amarre de frutos, el brotamiento de yemas laterales y la producción de frutos con buen calibre. CYTHOR además contiene micronutrientes en forma quelatada que actúa favorablemente en los procesos metabólicos promoviendo la fotosíntesis, regulando el crecimiento vegetativo, induciendo la floración, favoreciendo la calidad de la condición final de los frutos.

Sistema de preparación y aplicación

Agregue la dosis requerida del CYTHOR en un recipiente con agua limpia y agitar hasta lograr una mezcla homogénea, agregar al tanque de aplicación con la mitad del agua requerida, después agregar el resto del agua. El CYTHOR puede ser aplicado con diversos equipos utilizados para aplicación foliar.

CYTHOR deberá aplicarse diluido en agua a las dosis recomendadas y empleando la cantidad de agua necesaria para una completa y homogénea cobertura de los cultivos.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	RECOMENDACIONES	Dosis		P.C. (días)	L.M.R (ppm)
		L/cil 200 L	L/ha		
Palto	Favorece el amarre de frutos. Aplicar al cuajado de los frutos.	0,3	1,5**	N.A.	N.A.
Vid	Incrementa el calibre de bayas. Aplicar: en bayas de 4 - 6 mm.	-	1	N.A.	N.A.
Arándano	Aplicar cuando el cultivo se encuentra en estado fenológico de pre-floración a floración.	-	1 -1.5	N.A.	N.A.

LMR: Límite máximo de residuos expresados en ppm. P.C.: Período de carencia
*N.A.: No aplica **El gasto de agua se hizo con dosis en L/ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda el uso dentro de un programa de aplicaciones.

PERÍODO DE REINGRESO

Reingresar al área aplicada después de las 24 horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD

CYTHOR es compatible con la mayoría de los plaguicidas agrícolas excepto con los oxidantes fuertes.

FITOTOXICIDAD

CYTHOR no es fitotóxico para la planta a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



1.3 cm



Banda azul
Pantone 293C



Logo Cythor
Pantone 186C



Logo rojo CAISAC
Pantone 711 C



Logo azul CAISAC
Pantone 2945 C