

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- La aplicación de EcoSwing® debe ser efectuada por operarios agrícolas debidamente protegidos con los elementos de seguridad correspondientes al manejo de extractos vegetales de uso agrícola de Categoría IV (overol, guantes, gorra, botas de caucho, caretas, gafas).
- No ingerir.
- No se exponga al contacto, ni respire la niebla o vapores provenientes de la aspersión.
- Este producto puede ser irritante, por lo tanto, evite el contacto con la piel, ojos y mucosas.
- No comer ni beber ni fumar durante las operaciones de mezclas y aplicación.
- EcoSwing® no debe ser transportado ni almacenado junto con alimentos, bebidas, medicamentos ni plaguicidas. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado en un lugar fresco y airado, protegido de la incidencia directa de los rayos del solar y las altas temperaturas.
- Ningún envase que haya contenido extractos vegetales de uso agrícola deberá utilizarse para almacenar alimentos o agua potable.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llamar al médico o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta y la hoja informativa.
- En caso de ingestión: trasladar al paciente a un centro médico.
 - En caso de contacto con la piel: lavar el área afectada con abundante agua y jabón.
 - En caso de contacto con los ojos: enjuagar los ojos con agua limpia y fresca durante 15 minutos, si la irritación persistiera consultar al médico.
 - En caso de inhalación: retirar al afectado de la zona tratada a un lugar ventilado.
- Nota al médico
Teléfonos de emergencia: INFOSALUD: 0800-10-828, CISPQUIIM: 080-050-847
Antídoto: Tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en el tanque de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre
- Peligroso para los peces.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Nocivo para la fauna benéfica
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.



EcoSwing®

(Extracto vegetal)

FUNGICIDAD AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Extracto de Swinglea glutinosa..... 967,0 g/L

Aditivos..... csp. 1 Litro

Reg. PBUA N° 143-SENASA

Titular del registro:
FSR Consultores E.I.R.L.

Av. Las Camelias No. 877, Of. 302, San Isidro, Lima.
Teléfono: 5005349

Formulado por:

 ECOFLORA AGRO S.A.S.
Indiana Center
Alto de las Palmas vía
Medellín-Rionegro
Oficina 281.
Telf.: (57-4) 4481186
www.ecofloraagro.com

Lote N°:

F. Form.:

F. Venc.:

Importado y distribuido por:

 **Comercial Andina Industrial S.A.C.**
Av. Alfredo Benavides No. 1579. 7mo piso.
Of. 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú.
Teléfono: (01) 253-6444
atencionalcliente@grupoandina.com.pe

CONTENIDO NETO:

1 Litro

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- EcoSwing® es un fungicida que se debe aplicar en aspersión (preferiblemente) o en lavado garantizando una buena cobertura en toda la superficie foliar (haz y envés).
- Por tratarse de un producto biodegradable y de baja persistencia, debe ser aplicado de forma preventiva por lo menos una vez a la semana de forma irregular y continua. En cualquier momento de desarrollo de la planta preferiblemente antes de la aparición de síntomas o signos de la enfermedad o en su defecto cuando estos comiencen su aparición. Es muy efectivo en el marco de programas de Manejo Integrado de Cultivos (MIC) pues previene y controla la aparición de estas enfermedades.
- EcoSwing®, es un concentrado soluble que se diluye en el agua; para preparar la mezcla, agitar fuertemente el envase antes de abrirlo. Medir la cantidad recomendada y diluirla con suficiente cantidad de agua para luego llevarla al volumen o concentración deseada.
- La mezcla debe usarse inmediatamente después de ser preparada la solución.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos

Cultivo	Enfermedades		Dosis	PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico			
Vid	"Oidium"	Uncinula necator	300 a 4 00 m l/200L	N.A.	N.A.
	"Botrytis"	Botrytis cinerea	200 a 3 00 m l/200L	N.A.	N.A.
	"Podridón ácida"	Rhizopus stolonifer Aspergillus niger	1 a 2 L /ha	N.A.	N.A.
Alcachofa	"Podredumbre gris"	Botrytis cinerea	300 m l/200L	N.A.	N.A.
Fresa	"Podredumbre gris"	Botrytis cinerea	250 m l/200L	N.A.	N.A.
Quinua	"Mildiu"	Peronospora farinosa	500 m l/200L	N.A.	N.A.
Banano	"Podridón de la corona"	Fusarium spp.	3 m l/L*	N.A.	N.A.

PC: Período de carencia LMR: Límite máximo de residuo NA.: No aplica

* La solución de (1 litro) es para un promedio de 5 cajas de banano. Utilizar una boquilla de cono lleno, que otorgue una buena cobertura.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Las aplicaciones se deben realizar por las primeras horas de la mañana o por la tarde cuando la temperatura sea baja.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Puede ser aplicado en programas de Manejo Integrado de Plagas (MIP) y de Manejo Integrado de cultivos (MIC). No mezclar con productos a base de cobre.

FITOTOXICIDAD

EcoSwing® no presenta fitotoxicidad utilizado a la dosis recomendada.

INTERVALO DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar dos aplicaciones con un intervalo de 7 días.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"

Version 01



PRECAUCIÓN

