

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No ingerir el producto.
- Evitar el contacto con la piel, ojos además la inhalación de la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicina, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS GRUPO QUÍMICO: ORGANOFOSFATE

- En caso de inhalación: Trasladar al aire libre. Mantener al paciente en reposo y abrigarlo.
- En caso de contacto con la piel: Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y retirarla de forma controlada. Lavarse inmediatamente con abundante agua.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua los ojos durante 20 minutos.
- En caso de ingestión: Recurrir a la atención médica inmediata y mostrar el envase de este material o la etiqueta. Provoque vómitos solo si la persona está consciente.
- Síntomas: No específicos.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático. No tiene antídoto.

**TÉLEFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106
CAISAC: (01) 255-2830 / CISPQUIM: 0800-50847**

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Ligeramente tóxico para organismos acuáticos.
- No tóxico para aves y abejas.
- No contaminar las fuentes de agua (lagos, ríos, lagunas, etc.) con sobranes del producto o envase vacíos.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BOREAL 80 WP, es un fungicida sistémico, curativo y preventivo para el tratamiento de enfermedades producidas por hongos Oomicetes. Estimula los medios naturales de defensa de la planta.

Preparación:

Hacer una pre mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

COMPATIBILIDAD

BOREAL 80 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina, se recomienda hacer prueba previa a su utilización. Incompatible con fertilizantes foliares, aceites emulsionables, y productos a base de cobre.

FITOTOXICIDAD

BOREAL 80 WP no es fitotóxico usado a las dosis y usos recomendados en la presente etiqueta.

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN

Hasta tres aplicaciones, en los momentos de mayor actividad vegetativa.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas antes de las 12 horas después de la aplicación

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS kg/200 L	P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Arándano	Pudrición Radicular	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	0,75	14	200
Fresa	Tristeza	<i>Phytophthora citrophthora</i>	0,5	14	75
Mandarina	Gomosis del cuello	<i>Phytophthora nicotianae</i>	0,75	14	80
Páprika	Pudrición Radicular	<i>Phytophthora capsici</i>	0,5 - 1,0	15	0,05
Palto	Pudrición Radicular	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	0,5	14	50
Vid	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	0,5	28	100

P.C.: Periodo de Carenia

LMR: Limite Máximo de Residuos