

29.2 cm x 14.5 cm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fertiphos Combi-KLT es un concentrado soluble de microelementos quelatizados para una rápida y fácil asimilación por las plantas. Fertiphos Combi-KLT evita o corrige la deficiencia de elementos menores para asegurar excelentes cosechas. Cada microelemento de Fertiphos Combi-KLT tiene funciones específicas en el desarrollo y crecimiento de las plantas y todos están relacionados entre sí, la ausencia de cualquiera de ellos altera la función de otros.

BENEFICIOS

Fertiphos Combi-KLT corrige la carencia de microelementos indispensables para la formación de clorofila, proteínas y ayuda a la movilización y asimilación de otros nutrientes.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada cuando la aspersión haya secado sobre las hojas o después de una (1) hora de la aplicación.

FITOTOXICIDAD

No existe problemas de fitotoxicidad cuando se aplica en los cultivos y dosis recomendada.

COMPATIBILIDAD

- Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de mezclar Fertiphos Combi-KLT con otros productos que se aplicaran en el mismo tanque de mezcla.
- No se recomienda aplicar en conjunto con otros productos de marcada reacción ácida o alcalina.

RESPONSABILIDAD CIVIL: COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C.

no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta etiqueta.

FERTIPHOS<sup>®</sup>

COMBI-KLT

Microelementos Quelatizados

COMPOSICIÓN:

Magnesio (MgO) ..... 30 g/L

Manganeso (Mn) ..... 10 g/L

Hierro (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) ..... 10 g/L

Cobre (Cu) ..... 10 g/L

Zinc (Zn) ..... 10 g/L

Boro (B) ..... 1 g/L

Cobalto (Co) ..... 500 ppm

Molibdeno (Mo) ..... 200 ppm

Auxiliares de formulación ..... c.s.p 1 L

Formulado por:



Av. Benavides 1579, 7mo piso. Oficina 702.  
Edificio Del Park II, Lima 18 - Perú  
Telf.: (01) 255-2830

Distribuido por:



Av. Benavides 1579, 7mo piso. Oficina 703.  
Edificio Del Park II, Lima 18 - Perú  
Telf.: (01) 255-2830

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc:

Contenido Neto: 1L

| CULTIVO                                                                                        | DOSIS L/200L | MOMENTO DE APLICACIÓN                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algodón                                                                                        | 0.25 - 0.30  | 1° Antes de la floración<br>2° Después de formadas las bellotas.                                                                                                                                                                |
| Pimiento, tomate, ají, páprika, cebolla, ajo                                                   | 0.25 - 0.30  | 1° Durante el desarrollo vegetativo y antes de la floración.<br>2° Inmediato después del cuajo.                                                                                                                                 |
| Frijol, soya, haba, vainita, arveja                                                            | 0.25 - 0.30  | 1° Antes de la floración<br>2° Inmediato después del cuajo de las vainas.                                                                                                                                                       |
| Zapallo, sandía, melón, pepinillo                                                              | 0.25 - 0.30  | 1° Antes de la floración.<br>2° Inmediato después del cuajo de los frutos.                                                                                                                                                      |
| Frutales: Arándano, palto, maracuyá, mango, limón, mandarina, naranja, pomelo, vid, granadilla | 0.20         | 1° Durante el desarrollo vegetativo.<br>2° Antes de la floración.<br>3° Durante el desarrollo del fruto.                                                                                                                        |
| Papa                                                                                           | 0.25         | 1° Durante el desarrollo vegetativo.<br>2° Durante la tuberización.                                                                                                                                                             |
| Café                                                                                           | 0.20         | 1° Antes de la 1ra floración.<br>2° Inmediato después del cuajado del fruto (cerezo).                                                                                                                                           |
| Alcachofa                                                                                      | 0.25 - 0.30  | En Almacigo: A los 20 a 30 días de la siembra.<br>Después del trasplante: A los 60 y 90 días del trasplante.                                                                                                                    |
| Espárrago                                                                                      | 0.25 - 0.30  | En Almacigo:<br>1° A los 60 días de siembra<br>2° A los 30 días después de la primera cosecha.<br>Después del trasplante y cada cosecha:<br>1° Antes del inicio de la floración<br>2° A los 30 a 35 días de la 1ra. aplicación. |
| Marigold, flores                                                                               | 0.25 - 0.30  | En Almacigo: A los 20 a 30 días de la siembra.<br>Después del trasplante: A los 20 y 30 días del trasplante.                                                                                                                    |
| Arroz                                                                                          | 0.25 - 0.30  | Aplicar antes de la floración 1-2 veces cada 10 días.                                                                                                                                                                           |

PRECAUCIONES

- No transportar ni almacenar con personas, animales, alimentos, medicinas y bebidas.
- Para el manipuleo use guantes, botas de jebe, y mandil.
- Consérvese en lugar o almacén fresco en su envase original bien cerrado.

“AGITAR ANTES DE USAR”

1.3 cm

Fondo Verde  
Pantone 7741 C

Letra logo  
Pantone 137 C

Logo caisac  
Pantone 711 C

Logo caisac  
Pantone 2945 C

Logo semillas  
C2 M70 Y96 K0

Logo semillas  
C100 M80 Y0 K0