

**I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA**

Producto: FERTIPHOS COMBI - KLT
Formulador: COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C
Distribuidor: FERTILIZANTES y SEMILLAS ANDINAS S.A.C., una empresa de GRUPO ANDINA
Clase: Fertilizante foliar

Fecha de actualización: 21/04/2026

II. INGREDIENTES ACTIVOS (P/V)

Magnesio (MgO) 30 g/L
Manganeso (Mn) 10 g/L
Hierro (Fe₂O₃) 10 g/L
Cobre (Cu) 10 g/L
Zinc (Zn) 10 g/L
Boro (B) 1 g/L
Cobalto (Co) 500 ppm
Molibdeno (Mo) 200 ppm
Auxiliares de formulación c.s.p 1 L

III. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

Estado Físico Líquido
Color Verde
Olor Característico
Densidad 1.15 ± 0.05
pH 2.0 ± 0.5
Inflamabilidad No inflamable
Explosividad No explosiva
Corrosividad corrosiva
Estabilidad de almacenamiento: 3 años

IV. FORMULACIÓN

CONCENTRADO SOLUBLE – (SL)

V. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **FERTIPHOS COMBI-KLT** es un concentrado soluble de microelementos quelatizados para una rápida y fácil asimilación por las plantas.

VI. MODO Y/O MECANISMO DE ACCION

- Cada microelemento de **FERTIPHOS COMBI-KLT** tiene funciones específicas en el desarrollo y crecimiento de las plantas y todos están relacionados entre sí, la ausencia de cualquiera de ellos altera la función de otros.
- **FERTIPHOS COMBI-KLT** corrige la carencia de microelementos indispensables para la formación de clorofila, proteínas y ayuda a la movilización y asimilación de otros nutrientes.

VII. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS L/200 L	MOMENTO DE APLICACIÓN
Algodón	0.25 – 0.30	1° Antes de la floración 2° Después de formadas las bellotas.
Pimiento, tomate, ají, páprika, cebolla, ajo.	0.25 – 0.30	1° Durante el desarrollo vegetativo y antes de la floración. 2° Inmediato después del cuajo.
Frijol, soya, haba, vainita, arveja.	0.25 – 0.30	1° Antes de la floración 2° Inmediato después del cuajo de las vainas.
Zapallo, sandia, melón, pepinillo.	0.25 – 0.30	1° Antes de la floración 2° Inmediato después del cuajo de los frutos.
Frutales: Arándano, palto, maracuyá, mango, limón, mandarina, naranja, pomelo, vid, granadilla.	0.20	1° Durante el desarrollo vegetativo 2° Antes de la floración. 3° Durante el desarrollo del fruto.
Papa	0.25	1° Durante el desarrollo vegetativo. 2° Durante la tuberización.
Café	0.20	1° Antes de la 1ª floración 2° Inmediato después del cuajado del fruto (cerezo)
Alcachofa	0.25 – 0.30	En Almacigo: A los 20 a 30 días de la siembra. Después del trasplante: A los 60 y 90 días del trasplante.
Espárrago	0.25 – 0.30	En Almacigo: 1° A los 60 días de siembra 2° A los 30 días después de la primera. Después del trasplante y cada cosecha: 1° Antes del inicio de la floración 2° A los 30 a 35 días de la 1ra. aplicación.
Marigold, flores.	0.25 – 0.30	En Almacigo: A los 20 a 30 días de la siembra. Después del trasplante: A los 20 y 30 días del trasplante.
Arroz	0.25 – 0.30	Aplicar antes de la floración 1-2 veces cada 10 días.

VIII. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

- **FERTIPHOS COMBI-KLT** se recomienda aplicar de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta comercial.

IX. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.